

FICHA TÉCNICA FOLIBOR-K

FICHA TÉCNICA: FOLIBOR-K

Fertilizante à base de Borato de Potássio, 100% Solúvel em água, especialmente formulado para corrigir deficiências em Potássio e Boro, exclusivamente para uso agrícola.

COMPOSIÇÃO (w / w) : Óxido de Potássio Solúvel em Água (K₂O) 30.0 %
Boro Solúvel em Água (B) 14.0 %

Ph : 8.5 – 10.5

FORMA FÍSICA : PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS

ODOR : NENHUM

CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES _:

Isento de cloretos, sulfatos e azoto na forma nítrica ou amoniacal. Total e melhorada solubilidade face a outros sais de potássio. Sinergia Potássio/Boro. Antecipação da maturação e colheita. Melhoria na quantidade e qualidade do pólen.

Tolerância melhorada a doenças e situações de stress biótico e abiótico. Aumento da produtividade. Aumentos na concentração e acumulação de açucares (Grau BRIX), melhorias na coloração (antocianinas, carotenos). Melhoria na qualidade da casca (espessamento das paredes celulares). Máxima rentabilidade em situações variadas de culturas; produção forçada, amadurecimento forçado, culturas de produção escalonadas, culturas hidropónicas sempre que as incorporações de azoto tenham de ser reduzidas. Qualidade máxima para frutas com maior sabor e cor, maior calibre, dureza e consistência garantindo e maximizando o seu prazo de validade e armazenamento. Controle eficiente da doença do coração (deficiência em Boro) na beterraba e nas outras Crucíferas.

DOSES DE APLICAÇÃO:

FOLIBOR-K é recomendado para aplicação em todas as culturas agrícolas. A menos que declarado diferentemente nas culturas abaixo referidas, aplicar ente 1 a 3kg/ha por via foliar ou 4 a 8kg/Ha na aplicação directa ao solo, 3 semanas após a emergência. São preferíveis aplicações repartidas a uma aplicação única.

FRUTICULTURA : Ameixeira, Amendoeira, Pêssegos e Nectarinas, Pereiras e Macieiras, Cerejeira, Citrinos e Vinha – 1 kg/ha

HORTÍCOLAS : Tomates, pimenta, pepino, melão, melancia... 1 a 1,5 kg/ha

CRUCIFERAS entre as 8 e as 16 folhas - 2 kg/ha.

CULTURAS PARA FOLHAGEM ... Aplicar 4 a 8 Kg/ha directamente ao solo. Para melhores resultados repartir a dose por várias aplicações.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO- APLICAÇÃO AO SOLO

Aplicar em redor das plantas como um pó, spray líquido ou através do sistema de rega. Dissolver numa quantidade de água adequada à sua boa dissolução. Quando aplicado como um pó deve ser lavado ou molhado o solo nas 4 horas seguintes à aplicação. A aplicação ao solo por pulverização deve ser efetuada com um volume de água que garanta a boa introdução do produto no solo.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO – APLICAÇÃO NO SOLO

Não aplicar em condições de stress hídrico das plantas.

Dissolver numa quantidade de água adequada e suficiente para uma boa penetração no solo.

Em caso de pulverização, escolher dias sem vento e evitando a horas mais quentes.

PRECAUÇÕES

Provoca irritação oculares. Usar protecção ocular. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Agite antes de usar. Manter fora do alcance das crianças. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Armazenar em lugares frescos e secos e manter longe de temperaturas extremas. Conservar unicamente no recipiente de origem. Utilizar o produto conforme as instruções da etiqueta. Em caso de dúvida, contactar técnicos autorizados.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto entre -5, +25 C nas embalagens originais e fechadas com o sistema de fecho interno, longe de alimentos e do acesso de pessoas e animais. Evitar a exposição solar direta.

EMBALAGENS: 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 – 25 Kg.